



Quynh V. Le, MD, Inc
18225 Brookhurst St. Suite 6
Fountain Valley, CA 92708
Phone: (714) 200-1499
Fax: (714) 200-1497

HEMORRHOIDS BANDING - FEMA ENEMA

Cirugía - EUA, Colocación de Setones, Hemorroidectomía, Fístula Anal

Día antes de la cirugía

- No hay restricciones en la dieta.
- No comer ni beber después de la medianoche.
- Dos enemas de la flota: compre sin receta en su farmacia local. (\$3)
 - Cirugía AM – Un enema 2 horas después de la cena la noche anterior y un enema la mañana de la cirugía.
 - Cirugía del mediodía / PM – Dos enemas la mañana de la cirugía, a una hora de diferencia.



- **Nota: Utilizado para anal, no beber**

Instrucciones (debe estar en la botella)

- Para usar el enema, acuéstese sobre su lado izquierdo con las rodillas dobladas. Retire la tapa de la punta del aplicador e inserte suavemente la punta en el recto. Apriete lentamente la botella para vaciar el contenido en el recto. Para obtener mejores resultados, quédese acostado y sostenga el enema hasta que sienta la necesidad de defecar.
- General comenzará a funcionar entre 5-10 minutos.
- No comer ni beber hasta que se complete el procedimiento.
- Báñese o dúchese antes de llegar a la cirugía. No aplique lociones, perfumes o desodorantes.